

KÖRNERMAIS – Sortenversuch spät

☒ Walding (Urfahr Umgebung)

Standort

Versuchsform: Streifenversuch

Vorfrucht: Zuckerrübe

Niederschlag:	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Σ
(Quelle: HV)	49	100	60	58	44	312

Ackerbauliche Maßnahmen

Anbau: 05.04.2024

Düngung: 2.4.2024 520 kg/ha Linzer Pro 14/10/20

6.5.2024 230 kg/ha NAC

Pflanzenschutz: 5.5.2024 0,44 l/ha Adengo

Ernte: 07.10.2024

Ergebnis

Körnermais Sortenversuch spätes Reifesegment Walding						
Sorte	Firma	Reifezahl	Erntefeuchte [in %]	Feuchtertrag [kg/ha]	Trockenertrag bei 14% H ₂ O [kg/ha]	Ertrag [rel. %]
BRV2604D (Standard spät)	Probstdorfer	370	21,6	13.497	12.138	98
KWS ARTESIO	KWS	350	20,4	14.001	12.814	103
DieSELMA DKC4320	RWA	360	21,7	13.741	12.339	100
ANTARO	Saatbau	370	21,9	13.404	12.001	97
RGT PREXTON	RAGT	390	21,3	13.539	12.229	99
P9944	Pioneer	430	23,0	14.503	12.774	103
Mittelwerte			21,7	13.781	12.382	
Standardabweichung sind 912 kg das sind 7,5 % des Standardmittels						